



Alteraciones de la piel



FORMACIÓN POR
SCAPE
ACADEMY



- ACNE
- El acné es una enfermedad inflamatoria del complejo pilo-sebáceo, que se presenta en personas predispuestas por la obstrucción de la glándula sebácea, en donde intervienen 4 factores:
 - Formación anormal de queratina.
 - Colonización de esa zona estéril *Corine Bacterium Acnei* (1 y 2), estafilococos blancos (*Albus*), no patógenos, micro-levaduras (*Pityrosporum ovale*).
 - La hipersecreción de las glándulas sebáceas que empiezan en la pubertad y prosigue, siendo activadas por la influencia hormonal.
 - Modificación cualitativa del sebo, normalmente contienen un 70% de triglicéridos, de los cuales el 24% se encuentra en la superficie y los acneicos tienen un 60%.

Lesiones acneicas:

- Comedón: secreción sebácea más queratina que al contacto con el aire se oxida volviéndose un punto negro.
- Pápula: lesión maciza superficial, elevada y circunscrita de la piel de contenido purulento.
- Millium: Micro quiste sebáceo sin salida.
- Tuberosidades: Proceso inflamatorio profundo.
- Flegmones: Absesos profundos fluctuantes, son rebeldes al tratamiento, tienen forma del reloj de arena.



- **ROSACEA**

- La rosácea es una afección que aparece sobre todo entre los 30 y 50 años, de evolución crónica que puede alcanzar formas más o menos graves.
- En estado evolucionado, llega a la forma de “acné rosácea”. Su etiopatogenia es muy compleja, y hace intervenir factores tanto nerviosos como digestivos, vasculares y endocrinos. Su tratamiento debe realizarse tanto en el plano general como en el local.

FORMACIÓN POR
SCAPE
ACADEMY




- Aspecto clínico:
- Es una afección que se localiza en el rostro (frente, nariz, mejillas y barbilla). Encontramos dos clases de lesiones características de esta afección:
- Una eritrosis permanente de un tono más o menos rojizo, con fases congestivas y con redes de telagectasias, este conjunto forma un estado cuperósico.
- La presencia de elementos tipo foliculitis, elementos eruptivos que evolucionan sobre un fondo eritematoso.

Su evolución se produce en erupciones, y el aspecto de los elementos eruptivos es muy variable, son muy pequeños, pustulosos, y a veces con costras; Son verdaderos nódulos profundos, duros, sensibles. Esta última es la fase del acné rosácea.



FORMACIÓN POR
SCAPE
ACADEMY



- **ALTERACIONES DEL PIGMENTO**

- Las alteraciones de la pigmentación pueden ser generalizadas y afectar a muchas áreas de la piel, o pueden ser localizadas y afectar sólo a ciertas áreas de la piel. Los cambios que causan en la pigmentación se denominan

- Despigmentación
- Hipopigmentación
- Hiperpigmentación

- La despigmentación es la pérdida completa de pigmento. La piel es de color blanco. La despigmentación generalizada ocurre en el [vitíligo](#).

- La hipopigmentación es una cantidad anormalmente baja de melanina. La piel tiene un color más claro de lo normal. La hipopigmentación generalizada de la piel ocurre en el [albinismo](#).





- La hipopigmentación puede estar causada por
 - Una lesión previa en la piel, como una ampolla, una úlcera, una quemadura, la exposición a un agente químico o una infección cutánea
 - Afecciones inflamatorias de la piel que se han curado (como la [dermatitis atópica](#) o la [psoriasis](#))
 - Enfermedades hereditarias raras
- La [hiperpigmentación](#) suele estar causada por una cantidad anormalmente alta de melanina, pero a veces es causada por la deposición de otras sustancias pigmentadas que no suelen estar presentes en la piel. La piel presenta un color más oscuro y a veces es de un color diferente al normal. La hiperpigmentación puede estar producida por
 - Trastornos que causan inflamación
 - Fármacos o sustancias
 - Exposición a la luz solar
- [Introducción a la pigmentación cutánea - Trastornos de la piel - Manual MSD versión para público general \(msdmanuals.com\)](#)